

شناخته و استاندارد خدمت

کارگذاشتن کانولا (لوله ارتباطی) برای همودیالیز (شالدون گذاری)؛ ورید

یا (Scribner نوع) به ورید (محیطی) یا شریانی وریدی، خارجی،

شریانی وریدی خارجی، اصلاح یا بستن

تنظیم و تدوین اولیه:

آقای دکتر محمدهادی سعید مدقق دبیر بورد رشته فوق تخصصی جراحی عروق

جناب آقای دکتر خالق نژاد طبری دبیر بورد و رئیس انجمن جراحان کودکان ایران

جناب آقای دکتر حسینی دبیر بورد رشته تخصصی جراحی عمومی

سرکار خانم دکتر هومن رئیس انجمن نفرولوژی کودکان ایران

آقای دکتر جواد سلیمی فوق تخصص جراحی عروق

آقای دکتر مهدی داودی فلوشیپ جراحی عروق

آقای دکتر حسین همتی فلوشیپ جراحی عروق

آقای دکتر روزبه چراغلی فلوشیپ رجاحی عروق

آقای دکتر محمد حسنی فوق تخصص جراحی عروق

آقای دکتر جمال جلیلی شهری فوق تخصص جراحی عروق

آقای دکتر احمد حسین زاده فوق تخصص جراح عروق - نماینده دبیر بورد رشته تخصصی جراحی عمومی

آقای دکتر ارحمنی جانشین دبیر بورد رشته تخصصی طب اورژانس

آقای دکتر حسینی دبیر بورد رشته تخصصی جراحی عمومی

آقای دکتر جلالی فراهانی دبیر بورد رشته تخصصی بیهوشی

آقای دکتر عین الله جانشین دبیر بورد رشته فوق تخصصی نفرولوژی بزرگسال

سرکار خانم دکتر مخدومی دبیر بورد رشته تخصصی داخلی

آقای دکتر شادنیا فلوشیپ سم شناسی بالینی و مسمومیت ها

دکتر پیمان عرفان طلب اوینی فلوشیپ سم شناسی بالینی و مسمومیت ها

دکتر امیرحسام علیرضایی فوق تخصص نفرولوژی بزرگسال

دکتر شیما سماوات فوق تخصص نفرولوژی بزرگسال

دکتر سلطانی نژاد رئیس انجمن علمی سم شناسی بالینی و مسمومیت ها

با همکاری:

مرکز مدیریت پیوند و درمان بیماری های معاونت درمان

مشاور: دکتر سانا زبخشند رئیس گروه تدوین استاندارد و راهنمای بالینی معاونت درمان

تحت نظارت فنی:
گروه تدوین استاندارد و راهنمایی سالمت
دفتر ارزیابی فن آوری، تدوین استاندارد و تعریفه سلامت

مقدمه:

بیماران نیازمند همودیالیز یا هموپر فیوژن و پلاسما فرزیس اکثرا بیماران بدحالی بوده که جهت انجام همودیالیز یا هموپر فیوژن به صورت اورژانسی نیازمند تعییه کاتتر بوده که در وضعیت اورژانس از کاتتر های موقت جهت دسترسی به ورید مرکزی استفاده میشود.

(الف) عنوان دقیق خدمت (فارسی و لاتین) به همراه کد بین المللی:

کارگذاشتن کانولا (لوله ارتباطی) برای همودیالیز (شالدون گذاری)؛ ورید به ورید (محیطی) یا شریانی وریدی، خارجی،
(نوع Scribner) یا شریانی وریدی خارجی، اصلاح یا بستن

کد ملی: ۳۰۲۵۱۵

CPT2018:36800

قراردادن کانولا برای همودیالیز، هدف دیگر (عمل جداگانه)؛ ورید به ورید

(ب) تعریف و تشریح خدمت مورد بررسی:

تعییه کاتتر در بیماران نیازمند همودیالیز یا هموپر فیوژن و پلاسما فرزیس (و بعض این بیماران بدحال نیازمند دسترسی ورید مرکزی و بیماران ترومایی با شوک نیازمند تزریق خون) اکثرا بیماران بدحالی بوده و جهت انجام همودیالیز یا هموپر فیوژن به صورت اورژانسی نیاز به تعییه کاتتر بوده که در وضعیت اورژانس از کاتتر های موقت جهت دسترسی به ورید مرکزی استفاده میشود. که ترجیحا باید از سونوگرافی جهت وارد کردن سوزن و بر حسب نیاز از فلوروسکوپی جهت هدایت کاتتر در محل صحیح استفاده می شود.

(ج) اقدامات یا پروسیجرهای ضروری جهت درمان بیماری:

تعییه کاترهای همودیالیز یا هموپر فیوژن موقت در ورید مرکزی بهتر است در اتاق عمل انجام شود و در صورت عدم امکان انتقال به اتاق عمل به دلیل شرایط بیمار در ICU یا بخش اورژانس و یا بخش های بستری قرار داده می شود.

در مورد کودکان در اتاق عمل سرپایی و یا در PICU با بیهوشی خفیف و تحت مونیتورینگ قلبی صورت گیرد

• ارزیابی قبل از انجام پروسیجر:

- معاینه و شرح حال
- چک CBC /ptt/INR بر حسب بیماری زمینه ای و در صورت
- ارزیابی وضعیت عالیم حیاتی و هوشیاری بیمار
- اخذ رضایت جراحی اگاهانه در صورت هوشیاری و آگاهی بیمار و برای کودکان اخذ رضایت ازوالدین بیمار
- تهیه کاتر سایز مناسب
- آماده سازی ناحیه عمل

• ارزیابی حین پروسیجر:

- مانیتورینگ قلب و همودینامیک (در موارد تعییه مسیر غیر فمورال)
- تجویز اکسیژن در صورت نیاز
- استفاده از سونوگرافی جهت پانکچر وریدی (ارجح است)
- استفاده از فلوروسکوپی برای تعیین محل کاتر (برحسب نیاز) نیاز)
- استفاده از ونوجرافی برای بررسی وضعیت عروق(برحسب نیاز) در صورت سابقه دستکاری قبلی روی عروق و احتمال بسته بودن مسیر

• ارزیابی بعد از پروسیجر:

- مانیتور در اتاق ریکاوری و یا احیا در صورت دریافت بیهوشی
- کنترل محل عمل از نظر هماتوم
- انجام CXR- در موارد تعییه کاتر غیر فمورال
- پایش عالیم حیاتی و بالینی بیمار و رادیوگرافی کنترل در موارد تلاش ناموفق جهت دسترسی به عروق گردندی

• کنترل عوارض جانبی پروسیجر :

در صورت بروز عارضه بر حسب مورد درمان آن انجام شود مثلا پنوموتوراکس -هموتوراکس و هماتوم محل ...

د) تواتر ارائه خدمت (تعداد دفعات مورد نیاز / فواصل انجام):

این خدمت می تواند به طور مکرر در صورت نیاز و پیدا شدن مشکل برای کاتتر بیمار مجدد ارائه شود اما برای جلوگیری از تکرار بی مورد باید هرچه سریع تر برای بیمار اکسیس دائمی تعییه گردد.

ه) افراد صاحب صلاحیت جهت تجویز (Order) / خدمت مربوطه و استاندارد تجویز:

کلیه تخصص های بالینی به بالا بر اساس کوریکولوم آموزشی مربوطه

و) افراد صاحب صلاحیت جهت ارائه خدمت مربوطه:

جراحان عمومی و فوق تخصص و فلوشیپ های مربوطه

متخصصین داخلی و فوق تخصص و فلوشیپ های مربوطه

متخصص طب اورژانس

فوق تخصص جراحی کودکان

فوق تخصص نفرونولوژی کودکان

فلوشیپ PICU

متخصص بیهوشی و فوق تخصص و فلوشیپ های مربوطه

فلوشیپ سم شناسی بالینی و مسمومیت ها

ایترونشنال رادیولوژی

متخصص پزشکی قانونی

(این عمل در مرکزی انجام شود که اتاق عمل و جراح در دسترس برای کترل عوارض آماده باشند.)

ز) عنوان و سطح تخصص های مورد نیاز (استاندارد) برای سایر اعضای تیم ارائه کننده خدمت:

عنوان تخصص	تعداد مورد نیاز به طور استاندارد به ازای ارائه هر خدمت	میزان تحصیلات مورد نیاز	سابقه کار و یا دوره آموزشی مصوب در صورت لزوم	نقش در فرآیند ارائه خدمت	نحوه
بیهوشی	۱ نفر	تخصص	-----	در صورت نیاز	۱

۲	طبق بند (و)	۱ نفر	تخصص ، فلوشیپ یا فوق تخصص		انجام مداخله
۳	کارشناس بیهوشی	۱ نفر	کارشناسی		در صورت نیاز
۴	رادیولوژی	۱ نفر	متخصص		گزارش تصویربرداری
۴	کارشناس اتاق عمل یا پرستاری یا رادیولوژی	۱ نفر	کارشناسی		کمک به انجام مداخله

ح) استانداردهای فضای فیزیکی امکان ارایه خدمت:

بیمارستان

مرکز جراحی محدود

ط) تجهیزات پزشکی سرمایه‌ای به ازای هر خدمت:

دستگاه بیهوشی (در صورت لزوم با توجه به شرایط بیمار) و ست کاتتر گذاری، مانیتور همودینامیک، فلوروسکوپ در صورت نیاز، تجهیزات محافظت از اشعه، دستگاه سونوگرافی با پروب خطی

ی) داروها، مواد و لوازم مصرفی پزشکی جهت ارائه هر خدمت:

ردیف	اقلام مصرفی مورد نیاز	میزان مصرف (تعداد یا نسبت)
۱	کاتتر همودیالیز موقت	به تعداد لازم
۲	وسائل و داروهای بیهوشی و بی حسی موضعی	-
۳	پک استریل / دستکش استریل / محلول ضد عفونی کننده / کاور پروب استریل / سرنگ / شان استریل	به تعداد لازم
۴	سرم قابل تزریق / هپارین	به مقدار لازم
۵	نخ بخیه / گاز استریل / پانسمان	به تعداد لازم
۶	گاید واير هیدروفیلیک / ماده حاجب در صورت نیاز	به تعداد لازم
۷	ساير وسائل در صورت نیاز*	

*سرنگ به تعداد کافی - حداقل 2 سرنگ 5 سی سی و یک سرنگ 10 سی سی / لیدوکائین / چست لید جهت مانیتورینگ قلبی / چسب برای موقعي که وسائل پاپسماں ضد آب در دسترس نباشد/ کانولای اکسیژن و ...

ک) استانداردهای ثبت:

ثبت شرح حال، سابقه پزشکی، پلان درمانی، شرح عمل، سیر بیماری و خلاصه پرونده مطابق استانداردهای ابلاغی وزارت بهداشت انجام شود.

ل) انديکاسيون های دقیق جهت تجویز خدمت:

وريدهای مورد استفاده:

به ترتیب اولویت ورید ژوگولار داخلی و خارجی راست و چپ، (ورید فمورال، ورید ساپکلاوین (حتی الامکان در بیماران دیالیزی گذاشته نشود))

در صورت در دسترس بودن ورید ژوگولار داخلی استفاده از سایر وریدها توصیه نمی شود.

تبصره* به جز در موارد مسمومیت

۱- نارسایی کلیه به صورت حاد نیاز به دیالیز فوری

۲- مشکلات خونی (لكوفرزیس و پلاسمافرزیس و هموپرفیوژن و.....)

۳- مسمومیت

۴- علایم اوورلود حجمی مانند ادم حاد ریه و نارسایی قلب بدون پاسخ به درمان طبی (بدون نارسایی کلیه)

۵- بیماری های اتوایمیون مانند گیلن باره و میاستنی گراو

تبصره*: در صورت تعییه کاتتر فمورال در بیمار بستری **Ambulate** فقط برای یک جلسه دیالیز اورژانس و در بیمار استراحت مطلق حداکثر تا دو هفته توصیه می شود و بعد کاتتر خارج گردد و در محل دیگری غیر از فمورال تعییه گردد. (در بیماران فاقد دسترسی عروقی غیر از ورید فمورال از این قاعده مستثنی هستند)

تبصره* در موارد بیماران مشکل با سابقه کاتتر های متعدد قبلی که تعییه کاتتر با مخاطرات و عوارض بیشتری همراه است

تعییه کاتتر موقت در محلی انجام گیرد که امکان ونوگرافی تحت فلوروسکوپ استفاده از هدایت سونوگرافی و گاید واير

های مختلف در دسترس باشند.

م) شواهد علمی در خصوص کنترل انديکاسيون های دقیق خدمت:

- ۱) بیمارانی که نیاز به دیالیز اورژانس ندارند و تا زمان انجام دیالیز فرصت کافی برای کارگذاری اکسیس دائمی دارند.
- ۲) وجود همزمان اکسیس دائمی آماده استفاده و مناسب برای همودیالیز.
- ۳) اختلالات انعقادی بر حسب ضرورت توسط پزشک معالج تصمیم گیری شود
- ۴) وجود کانون عفونی فعال در محل تعییه شالدون بر اساس نظر پزشک معالج

ن) مدت زمان ارائه هر واحد خدمت:

ردیف	عنوان تخصص	میزان تحصیلات	مدت زمان مشارکت در فرایند ارائه خدمت	نوع مشارکت در قبل، حین و بعد از ارائه خدمت
۱	بند (و)	فوق تخصص - فلوشیپ تخصص	زمان تقریبی ۱ ساعت	انجام پروسیجر
۲	متخصص بیهوشی	تخصص	زمان تقریبی ۱ ساعت و ۳۰ دقیقه	مراقبت های بیهوشی در صورت نیاز

س) مدت اقامت در بخش های مختلف بسترهای جهت ارائه هر بار خدمت مربوطه:

در بیماران سرپایی در بیمارستان و یا مراکز جراحی محدود قابل انجام است و ۲ ساعت مراقبت بعد از پروسیجر کفايت می کند.

ع) موارد ضروری جهت آموزش به بیمار (موارد آموزشی که باید به بیمار-همراه- به صورت شفاهی، گتبی در قالب فرم آموزش به بیمار، پمپلت آموزشی ، CD و ... آموزش داده شود تا روند درمان را تسريع نموده و از عوارض ناشی از درمان جلوگیری نماید):

مراقبت های لازم در نگهداری مناسب کاتتر از نظر نظافت و تعویض پانسمان و نحوه استحمام باید ارائه شود.

منابع:

Rutherford,s Vascular Surgery and Endovascular Therapy 2023.